

Vicks VapoDry® şurup

FORMÜLÜ

Her 5 mL'de,

Dekstrometorfan HBr

10 mg

Psödoefedrin HCl

20 mg

Klorfeniramin maleat

2 mg

Koruyucu: Sodyum benzoat

Tatlandırıcı: Sorbitol, şeker, mentol

Boyar maddeler: Ponso 4R, titanyum dioksit

Alkol

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dekstrometorfan HBr merkezi etkili bir öksürük kesicidir. Efedrinin bir stereo-isomeri olan psödoefedrin HCl, adrenerjik reseptörler üzerinde sempatomimetik etki göstererek nazal ve bronşiyal konjesyonu giderir. Klorfeniramin maleat ise, güçlü antihistaminik özelliklere sahip bir alkilamin türevidir.

ENDİKASYONLARI

Genellikle soğuk algınlığı ve alerji gibi durumlarda görülen, boğaz ve bronşlardaki tahrişe bağlı öksürük ve burun tıkanıklığını gidererek hastanın rahatlamasını sağlar.

KONTRENDİKASYONLARI

Vicks VapoDry, bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Aralarında psödoefedrin HCl'nin de bulunduğu sempatomimetik aminler, şiddetli hipertansiyon, koroner kalp hastalığı gibi kardiyovasküler hastalığı olanlarda kontrendike olduğundan, Vicks VapoDry bu hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER

İki yaşından küçük çocuklara hekim önerisi olmadan verilmemelidir. İlacın kullanılmasına karşın öksürüğün kesilmediği durumlarda doktorunuza başvurunuz. Önerilen doz aşılmamalıdır. Sigara içme, astım ve amfizem gibi alt solunum yollarından kaynaklanabilen öksürüklerde hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

60 yaş üzerindeki hastalarda, hipertansiyonu, hipertirodizmi, diabetes mellitusu kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokomu veya prostat hipertrofisi (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Yardımcı madde olarak şeker ve alkol içermektedir.

Bileşimindeki antihistaminik, alkol ve diğer merkezi depresan ilaçların yol açacağı sedasyonu arttırabileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır. Her ilaçta olduğu gibi gebeler ve emziren anneler, ilacı kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Bazı hastalarda, özellikle yüksek doz alanlarda, sedasyon, halsizlik, baş dönmesi, sinirlilik görülebilir. Ender olarak bulantı, kusma, kan basıncında yükselme, anoreksi, idrar yapmakta güçlük ve ağız kuruluğu bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Alüminyum hidroksit içeren ilaçlarla birlikte alındığında, psödoefedrin HCl'in emilimi hızlanır. Klorfeniramin maleat'ın fenitoin ile birlikte alınması, fenitoinin özgü yan etkilerin şiddetlenmesine yol açabilir.

Antidepresan ya da MAO inhibitörü kullananlarda, yan etkiler şiddetlenebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.

3-6 yaş arası: 3-4 x 2.5 mL/gün (3-4 x ½ ölçek)

6-9 yaş arası: 3-4 x 2.5-5 mL/gün (3-4 x ½-1 ölçek)

9-12 yaş arası: 3-4 x 5 mL/gün (3-4 x 1 ölçek)

Erişkin (>12 yaş): 3-4 x 5-10 mL/gün (3-4 x 1-2 ölçek)

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Doz aşımı durumunda belirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Her 5 mL'sinde 10 mg dekstrometorfan HBr, 20 mg psödoefedrin HCl ve 2 mg klorfeniramin maleat bulunan 60 ve 120 mL'lik şişelerde.

RUHSAT SAHİBİ

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7
Levent 34394, İstanbul

ÜRETİM YERİ

Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

RUHSAT TARİHİ: 28.07.2008

RUHSAT NO: 216/47

Prospektüs onay tarihi: 08.08.2008

Reçete ile satılır.