

VICKS VapoSyrup® Ekspektoran Şurup

FORMÜLÜ

Her 15 mL'de,

Guaifenesin..... 200 mg

Koruyucu: Sodyum benzoat

Boyar maddeler: Sunset yellow, kinolin sarısı

Tatlandırıcı: Şeker

(Diyabetliler için: 15 mL Vicks VapoSyrup 7.68 g glikoza eşdeğer kalori içerir.)

Alkol

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Guaifenesin, bronşlarda bulunan mukusun viskozitesini azaltarak ekspektoran etki gösteren bir bileşiktir. Ekspektoran etki sistemik ve topikal mekanizmalara bağlıdır. Koyu kıvamlı mukusun viskozitesinin azalmasıyla siliyer hücrelerin mukusu dışarı atması kolaylaşır.

ENDİKASYONLARI

Boğaz ve bronşlarda koyu kıvamlı mukusun atılmamasına bağlı her türlü öksürük durumlarında endikedir. Bronşitlerde ek tedavi olarak mukusun çıkarılmasını kolaylaştırır ve iyileşmeyi hızlandırır.

KONTRENDİKASYONLARI

Vicks VapoSyrup'un bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER

İki yaşından küçük çocuklara hekim tavsiyesi olmadan verilmemelidir. İlacın kullanılmasına karşın öksürüğün kesilmediği durumlarda doktora danışılmalıdır.

Önerilen doz aşılmamalıdır.

Guaifenesinin gebelerde kullanılmasının sakıncalı olduğunu gösteren herhangi bir veri yoksa da, bütün ilaçlarda olduğu gibi, özellikle gebeliğin ilk 3 ayında ve emzirenlerde kullanılması önerilmez.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Bazı hastalarda gastrointestinal rahatsızlık hissi görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: 4 saatte bir 15 mL

6-11 yaş arası çocuklar : 4 saatte bir 10 mL

2-5 yaş arası çocuklar : 4 saatte bir 5 mL

Günlük toplam miktar 6 dozu aşmamalıdır.

Hekim tavsiyesi olmadan uzun süre kullanılmamalıdır.
(Ambalajla verilen ölçek 5, 10 ve 15 mL olarak ölçümlendirilmiştir.)

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Çok yüksek dozlarda alındığında, bulantı ve kusma görülür. Kana geçen guaifenesin hızla metabolize olur ve idrarla atılır. Semptomatik tedavi yeterlidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Her 15 mL'de 200 mg guaifenesin bulunan 120 mL'lik şişelerde.

RUHSAT SAHİBİ

The Procter & Gamble Company lisansı ile
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394 İstanbul

ÜRETİM YERİ

Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

RUHSAT TARİHİ: 2.6.1994

RUHSAT NO: 169/8

Reçete ile satılır.

Prospektüs onay tarihi: 30.03.2001