



Seri no.:  
Üretim Ta.:  
Son Kul. Ta.:

Bileşimi  
1 ml inhalelerde  
Etkin maddeler:  
Kafur: 396.71 mg (%41.54 v/v)  
Mentol: 396.71 mg (%41.54 v/v)  
Yardımcı madde olarak sibirya çamı yaprağı yağı, metil salisilat içerir.

Önerilen Kullanım Yeri  
Burun tıkanıklığında nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Uyarılar/Önlemler  
Vicks Inhaler 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu yaş grubunda mentol ve kafur kullanımı ile larengospazm, apne ve solunum kollapsına dair bildirimler bulunmaktadır. Kafurun plasentadan geçtiği bilinmektedir. Fetal malformasyonlar bildirilmemiş olmakla birlikte, tüm ilaçlarda olduğu gibi, Vicks inhaler gebelikte doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Önerilen Kullanım Yeri  
Burun tıkanıklığında nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Uyarılar/Önlemler  
Vicks Inhaler 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu yaş grubunda mentol ve kafur kullanımı ile larengospazm, apne ve solunum kollapsına dair bildirimler bulunmaktadır. Kafurun plasentadan geçtiği bilinmektedir. Fetal malformasyonlar bildirilmemiş olmakla birlikte, tüm ilaçlarda olduğu gibi, Vicks inhaler gebelikte doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Dekongestan



Yapışkanlı Alan

#### SAKLAMA KOŞULLARI

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.  
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

#### TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

1 ml likit içeren inhaler ambalajlarda.

#### İZİN SAHİBİ

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.  
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7  
Levent 34394 İstanbul

#### ÜRETİM YERİ

Procter & Gamble GmbH Manufacturing GmbH,  
Gross Gerau / Almanya

İzin tarihi: 04.09.2007

İzin no: 2007/4

Sadece eczanelerde satılır.

## VICKS Inhaler

Vicks Inhaler güçlü yağlardan oluşan bir sıvı içeren nazal inhalelerdir.

#### Birim Formülü

1 ml inhalelerde

Etkin maddeler:

Kafur: 396.71 mg (%41.54 v/v)

Mentol: 396.71 mg (%41.54 v/v)

Yardımcı madde olarak sibirya çamı yaprağı yağı, metil salisilat içerir.

#### TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Kafur ve mentol direk inhalasyonla veya merhem formlarının inhalasyonu ile nazal konjesyonu giderir. Esansiyel yağlar eskiden beri soğuk algınlığı semptomlarını gidermede kullanılmaktadır. Aromatik kokuları sayesinde solunum yollarında rahatlama sağlamaktadır. Her iki etkin madde de benzer şekilde nazal hava akımı algılamasında düzelme sağlar. Etkin maddeler olan esansiyel yağlar, inspirasyon havasıyla seyreltilmiş buhar şeklinde solunum yollarına ulaşır. Her solukta yaklaşık 1 mg esansiyel yağ bulunur. Buharı

tümü mukus membranlarla temas halinde olmadığından sadece küçük bir kısmı sistemik olarak emilir. Kafur mukus membranlardan hızla emilir. Yüksek oranda yağda çözünürlüğü nedeniyle adipoz dokuda dağılımı yüksektir. Karaciğerde hızla metabolize olur ve idrarda kamfoglukuronik asit şeklinde atılır. %1 oranında bir kısmı akciğerlerden değişmeden atılır. Mentolün yağda çözünürlüğü yüksektir. Mukozadan hızla emildikten sonra karaciğerde hızla metabolize olur. Karaciğerde inaktif metabolitlerine dönüşerek böbreklerden atılır.

#### ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Burun tıkanıklığında nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

#### KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Mentol, kafur ya da bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Astımılılarda kullanılmamalıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

#### UYARILAR/ÖNLEMLER

Vicks Inhaler 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu yaş grubunda mentol ve kafur kullanımı ile larengospazm, apne ve solunum kollapsına dair bildirimler bulunmaktadır. Kafurun plasentadan geçtiği

bilinmektedir. Fetal malformasyonlar bildirilmemiş olmakla birlikte, tüm ilaçlarda olduğu gibi, Vicks inhaler gebelikte doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

#### YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Ciddi advers etkiler bildirilmemiştir. En sık görülen yan etkiler uygulama sırasında hafif yanma ve batma hissidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilmektedir.

İSTENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE FARMAKOVİJÜLANS MERKEZİ(TUFAM)'NE BİLDİRİNİZ.

#### İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

#### GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Erişkinler ve 2 yaşın üstünde çocuklarda ihtiyaç halinde, her bir burun deliği içine sokularak uygulanır. 5 gün süreyle semptomlarda düzelme olmadığı takdirde doktora başvurulmalıdır.

CLIENT :	BARCODE No :	PROCESS COLOR	SPOT COLOR	OTHER	NOTE
JOB NAME :	SAP CODE :				
FILE NAME :	COLORS : 3 SPOT COLORS				
JOB No :	OUTPUT SIZE : %100				
DATE :	OTHER :				
REVISION DATE :					
REVISION No :					
ARTWORK BY : FATİH DALOĞLU					
COUNTRY : TÜRKİYE (TR)					