



Eczacıbaşı

VICKS VapoRub Buharlaşan Merhem

BİRİM FORMÜLÜ

38 g VICKS VapoRub'un bileşiminde,
Mentol 1.045 g, Kafur 1.9 g, Ökalyptüs yağı 0.57 g, K. Hindistan cevizi yağı 0.285 g,
Sedir ağacı yaprağı yağı 0.285 g, Terebentin yağı 1.9 g, Timol 0.095 g, Vazelin q.s.
(31.92 g) içerir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

VICKS VapoRub, lokal konjestiyon ve soğuk algınlığının solunum yollarında neden olduğu tahrişe bağlı rahatsızlıkların haricen tedavisinde kullanılan çift etkili bir preparattır. Aktif maddeleri arasında yer alan kafur ve mentol, etkisiyle sürüldüğü bölgede kılcal damarların genişlemesini sağlayarak bu bölgeyi ısıtır ve birikmiş toksinlerin atılmasını kolaylaştırarak ağrıyı ortadan kaldırır. Aktif maddeleri arasında yer alan ökalyptol, terebentin ve mentol, solunum yoluyla akciğerlerde salgı artırıcı ve yumuşatıcı etki yapar.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Hapşırık, öksürük, ses kısıklığı, boğaz ve bronş mukozasında hafif akıntı, nezle ile birlikte soğuk algınlığı yakınmalarında sağlık durumunun düzeltilmesine yöneliktir.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Mentol, kafur ya da bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Merhem, zarar görmüş veya iltihaplanmış cilde veya açık yaraların üzerine sürülmemelidir. Bronşiyal astım veya solunum yollarında aşırı hassasiyetin eşlik ettiği solunum yolu hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Akut akciğer hastalıklarında solunarak içe çekilmemelidir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

VICKS VapoRub'ı yutmayınız. Burun deliklerinin içine sürmeyiniz. Küçük çocukların burun deliklerinin içine sürüldüğünde ani kolaps yapabilir.

Soluma durumunda: kaynar su ile uygulanmalı ve asla mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:

Preparat gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmadan önce, bir hekime danışılmalıdır. Emzirme döneminde, meme bölgesine uygulanmamalıdır.

Çocuklarda uygulama:

2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. 6 yaşından küçük çocuklar soluyarak içlerine çekmemelidirler.

Acil önlemler, semptomlar ve antidotu

Kaşıntılı cilt kızarıklıkları (temas egzaması) oluşması durumunda, merhem kalıntıları yemeklik yağ emdirilmiş kağıt peçetelerle uzaklaştırılmalı ve ürünü kullanmaya son verilmelidir. Gerekirse, alerjik cilt semptomlarına yönelik standart tedavi uygulanmalıdır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda hatalı şekilde buruna veya yüze uygulanması sonucu solunum bozukluklarının (glottis krampisi) oluşması durumunda, uygun yoğun bakım işlemleri başlatılmalıdır.



Eczacıbaşı

VICKS VapoRub Buharlaşan Merhem

Bir kafur intoksikasyonu şüphesi (örn. büyük miktarlarda ürünün yanlışlıkla oral yoldan alınmasını takiben) varsa, hastanın hastaneye yatırılarak kontrol altında tutulması uygun olacaktır. Örn. serebral ataklar gibi kafur intoksikasyonu semptomları, uygun şekilde tedavi edilmelidir (örn. i.v.Diazepam). Solunum depresyonu oluşması halinde, intübasyon ve gerekirse yoğun tıbbi koşullar altında solunum desteği düşünülmelidir.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Nadiren ciltte aşırı hassasiyet reaksiyonları veya temas alerjisi (örn. temas egzaması) görülebilir.

İçinde mentol bulunan eterik yağların solunması, ender olarak öksürüğe neden olabilir.

İSTENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DURUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TUFAM)'NE BİLDİRİNİZ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sürerek uygulama (haricen uygulama)

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Günde 2-4 kez, 2-3 çay kaşığı kadar

6-12 yaş arası çocuklar: Günde 2-4 kez, 1-2 çay kaşığı kadar

2-5 yaş arası çocuklar: Günde 2-3 kez, ½-1 çay kaşığı kadar

Soluma yoluyla uygulama:

Erişkinler ve çocuklarda (6 yaşından küçüklerde uygulanmaz): Bir soluma çözeltisi oluşturmak üzere 1-2 çay kaşığı.

Uygulama şekli ve süresi:

Sadece haricen veya solumak suretiyle kullanılır.

Haricen uygulama:

Vicks VapoRub erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda göğse, boyna ve sırtta sürülür ve 3-5 dakika süreyle hafif masaj yaparak özenle yedirilir.

2-5 yaş arası çocuklarda, sadece göğse ve sırtta sürülür, burun ve yüz bölgesine sürülmemelidir.

Rahat ve geniş giysiler giyilmesi, buharların solunmasını kolaylaştırır. Vicks VapoRub eterik yağları saatler boyunca açığa çıkardığından, özellikle de uykudan önce uygulanması tavsiye olunur.

Soluma yoluyla uygulama:

Çok yoğun bir rahatlık sağlamak için Vicks VapoRub soluma yoluyla da uygulanabilir.

Erişkinlerde ve çocuklarda (6 yaşından küçüklerde uygulanmaz) 1-2 çay kaşığı Vicks VapoRub bir çanağın veya büyük yüzeyli bir kabın içine konulur. ½ litre su sıcak olacak, fakat kaynamayacak şekilde ısıtılarak (hiçbir zaman mikrodalgada ısıtılmamalıdır), kaba ilave edilir. Oluşan buharlar 10-15 dakika süreyle solunur. Soluma sırasında su ısıtılmaya devam edilmemelidir; kullandıktan sonra da tekrar ısıtılmamalıdır. Soluma sırasında çocuklar yalnız bırakılmamalıdır.

3-5 gün sonra yakınmalarda önemli bir iyileşme olmaması veya öksürüğün ısrarla devam etmesi veya daha da kötüleşmesi, ateşin çıkması veya ısıklık çalar gibi öksürme



Eczacıbaşı

VICKS VapoRub Buharlaşan Merhem

durumunda, daha ciddi bir hastalık olasılığı nedeniyle bir hekime başvurulması tavsiye edilir.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

38 gram merhem içeren ambalajlarda.

İZİN SAHİBİ

The Procter & Gamble Company USA lisansı ile
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sk. No: 7
Levent 34394, İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA

Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C'nin altında ve çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İzin Tarihi:03.09.2008

İzin no:2008/81

VICKS ve VapoRub isimleri tescil edilmiştir.
Sadece Eczanelerde satılır.